

2014  
**Examen du Jeudi 18 décembre Version 2**

---

*Durée : 3 heures.*

*Tous les documents sont interdits, ainsi que les calculatrices et les téléphones portables.  
Les exercices sont indépendants entre eux.*

---

**Exercice 1. Questions de cours.**

1. Soit  $A$  une partie de  $\mathbb{R}$ . Dire à quelle(s) condition(s) l'ensemble  $A$  admet une borne supérieure dans  $\mathbb{R}$ . Donner la définition de la borne supérieure de  $A$ .
2. **Variante** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction définie sur  $\mathbb{R}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$  un nombre réel. Donner la définition précise de  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \ell$ .
3. On considère l'application  $g : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$  définie par  $g(z) = iz + 3$ . Quelle est la nature géométrique de  $g$ ? Préciser les caractéristiques de  $g$ .

**Exercice 2.**

1. Résoudre, dans  $\mathbb{C}$ , l'équation  $z^6 = 1$ .
2. Montrer que  $i$  est une solution de l'équation  $z^6 = -1$ . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $z^6 = -1$  dans  $\mathbb{C}$  en exprimant les racines de cette équation sous formes exponentielles, cartésiennes et trigonométriques, et les dessiner sur le cercle unité.

**Exercice 3.** Considérons dans  $\mathbb{R}^3$  les trois vecteurs suivants

$$u_1 = (1, -1, 2), \quad u_2 = (1, 3, -1), \quad u_3 = (3, 1, 3).$$

Soit  $F = \text{Vect}(u_1, u_2, u_3)$  le sous-espace vectoriel engendré par  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .

1. La famille  $(u_1, u_2, u_3)$  est-elle libre? Quelle information peut-on en déduire pour  $\dim F$ ?
2. Le sous-espace vectoriel  $F$  est-il de dimension 0? de dimension 1?
3. En déduire la dimension de  $F$ . Montrer que  $(u_1, u_2)$  est une base de  $F$ . Exprimer le vecteur  $u_3$  comme une combinaison linéaire des vecteurs  $u_1$  et  $u_2$ .

Considérons le sous-ensemble  $G$  de  $\mathbb{R}^3$  défini par

$$G = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid -5x + 3y + 4z = 0\}.$$

4. Le sous-ensemble  $G$  de  $\mathbb{R}^3$  est-il un sous-espace vectoriel de  $\mathbb{R}^3$ ?
5. Donner une base  $\mathcal{B}$  de  $G$  et la dimension de  $G$ .
6. Compléter la base  $\mathcal{B}$  de  $G$  en une base de  $\mathbb{R}^3$ .

7. A-t-on  $F = G$  ?

**Exercice 4.** On considère la fonction  $h : [-1, 1] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par

$$h(x) = \frac{1}{x}(\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}).$$

1. Pour  $|u| < 1$ , calculer  $(\sqrt{1+u} - \sqrt{1-u})(\sqrt{1+u} + \sqrt{1-u})$ , puis montrer que  $\lim_{x \rightarrow 0} h(x) = 0$ .

**On note  $f$  le prolongement par continuité de  $h$  en  $0$ .**

2. Etudier la parité et la continuité de  $f$ .
3. Montrer que  $f$  est dérivable en  $0$ .
4. Montrer que  $f$  est dérivable sur  $] -1, 1[ \setminus \{0\}$ . Calculer sa dérivée sur  $] -1, 1[ \setminus \{0\}$  et montrer qu'elle vérifie :

$$\forall x \in ] -1, 1[ \setminus \{0\}, f'(x) \text{ est du même signe que la fonction } \sqrt{x^2+1} - \sqrt{1-x^2}.$$

5. Déterminer le signe de  $f'$  sur  $]0, 1[$  et dresser le tableau de variation de  $f$ .
  6. Déterminer  $J = f([-1, 1])$ .
  7. On définit l'application  $g : [-1, 1] \rightarrow J$  par  $g(x) = f(x)$  pour tout  $x \in [-1, 1]$ .  
Montrer que  $g$  est une bijection.
- On note  $g^{-1}$  la bijection réciproque de  $g$ .**
8. Déterminer la parité, la continuité et le sens de variation de  $g^{-1}$ .
  9. Etudier la dérivabilité de  $g^{-1}$  sur  $] -1, 1[$ . Donner la formule du cours permettant de calculer la dérivée de  $g^{-1}$  à partir de celle de  $g$  et calculer la dérivée de  $g^{-1}$  en  $0$ .
  10. Tracer le graphe de  $g^{-1}$ .