Problème : Plus courts chemins – (10 points)

On s'intéresse au calcul des longueurs des plus courts chemins (PCC) dans un graphe orienté et valué $G = (S, A, w)$. Comme en cours, on note $\delta_G(x, y)$ la longueur d'un PCC entre x et y dans le graphe G .

Dans cet exercice, on va utiliser deux transformations de G :

- La première transformation est le graphe $G^+ = (S^+, A^+, w^+)$ tel que $S^+ = S \cup \{x_0\}$ où x_0 est un nouveau sommet, $A^+ = A \cup \{(x_0, u) \mid u \in S\}$ et : $w^+(u, v) = \begin{cases} w(u, v) & \text{si } (u, v) \in A \\ 0 & \text{si } u = x_0 \text{ et } v \in S \end{cases}$

G^+ contient donc les sommets et les arcs de G avec les mêmes poids, mais contient en plus un nouveau sommet x_0 relié à tous les autres par des arcs de poids nul.

- Et étant donnée une fonction f qui associe à chaque sommet de S une valeur dans $\mathbb{R}$ (c.-à-d. $f : S \rightarrow \mathbb{R}$), on définit la seconde transformation comme le graphe $G_f = (S, A, w_f)$ où $w_f(u, v) = w(u, v) + f(u) - f(v)$. G_f a donc les mêmes sommets et les mêmes arcs que G , seuls les poids des arcs changent.

La figure 2 présente un graphe M , son graphe associé M^+ ainsi que deux exemples de graphe " M_f " : le graphe M_g pour la fonction g définie par : $g(q_1) = 2, g(q_2) = -1, g(q_3) = 4$ et $g(q_4) = 0$ et le graphe $M_{g'}$ pour $g'(q_1) = -1, g'(q_2) = 3, g'(q_3) = 1$ et $g'(q_4) = -5$.

FIGURE 2 – Exemple d'un graphe M , sa transformation M^+ et deux transformations M_g et $M_{g'}$ pour les deux fonctions différentes g et g' .

On suppose donnés un graphe $G = (S, A, w)$ et une fonction $f : S \rightarrow \mathbb{R}$.

Questions de cours.

- ✓ 0.a Etant donnés deux sommets u et v , donner les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'il existe un plus court chemin entre u et v dans G .
- ✓ 0.b Donner la complexité des algorithmes de Dijkstra et de Bellman-Ford. Quelle est la différence importante entre ces deux algorithmes ?
- ✓ 0.c Que signifie le booléen renvoyé par l'algorithme de Bellman-Ford ?

Propriétés.

- 1.a Soit $\rho = u \rightarrow \dots \rightarrow v$ un chemin de u à v dans G (et dans G_f). Exprimer le poids¹ $w_f(\rho)$ du chemin ρ dans G_f en fonction de $w(\rho)$ (c'est-à-dire le poids du même chemin

1. la somme du poids de chaque arc du chemin...

dans G). En déduire que ρ est un plus court chemin entre u et v dans G si et seulement si ρ est un plus court chemin de u à v dans G_f .

- 1.b Montrer que G contient un circuit strictement négatif si et seulement si G_f contient un circuit strictement négatif.
- 1.c Montrer que G contient un circuit strictement négatif si et seulement si G^+ contient un circuit strictement négatif.

2. Pour le graphe M de la figure 2 :

- ✓ 2.a Donner les longueurs $\delta_{M^+}(x_0, q_1)$, $\delta_{M^+}(x_0, q_2)$, $\delta_{M^+}(x_0, q_3)$, et $\delta_{M^+}(x_0, q_4)$.
- ✓ 2.b Construire le graphe M_h où h est définie par : $h(q_i) \stackrel{\text{def}}{=} \delta_{M^+}(x_0, q_i)$ pour $i = 1, \dots, 4$.

Pour les 3 questions suivantes (3.a, 3.b, et 3.c), on suppose donné un graphe G sans circuit strictement négatif.

On note $h : S \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction donnant la longueur des PCC entre x_0 et les sommets de S dans G^+ : c'est-à-dire $h(u) = \delta_{G^+}(x_0, u)$ pour tout $u \in S$. Et on va utiliser cette fonction pour construire le graphe $G_h = (S, A, w_h)$ défini comme précédemment.

- 3.a Montrer que l'on a toujours $h(v) \leq w(u, v) + h(u)$. En déduire que l'on a $w_h(u, v) \geq 0$ pour tout $(u, v) \in A$.
- ✓ 3.b Quel algorithme doit-on utiliser pour trouver la longueur d'un PCC entre u et v dans G_h ? Justifier votre réponse.
- 3.c Utiliser la question 1.a pour exprimer la longueur $\delta_G(u, v)$ d'un PCC entre u et v dans G en fonction de la longueur $\delta_{G_h}(u, v)$ d'un PCC entre u et v dans G_h .

Algorithme. L'algorithme de Johnson est décrit par l'algorithme 1. On y utilise une matrice D de taille $|S| \times |S|$ pour représenter les distances des PCC entre chaque couple de sommets : pour les sommets u et v , le coefficient correspondant est noté d_{uv} .

Expliquer ce que fait cet algorithme. Pourquoi utilise-t-il d'abord l'algorithme de Bellman-Ford? Quelle est sa complexité?

Procédure Algo-Johnson(G)

// $G = (S, A, w)$: un graphe orienté, valué avec $w : A \rightarrow \mathbb{R}$.

begin

$D :=$ matrice($S \times S$) telle que $d_{uv} = \infty$ pour tout $u, v \in S$

$G^+ :=$ Graphe($S \cup \{x_0\}, A \cup \{(x_0, u) \mid u \in S\}; \bar{w}$) avec $\bar{w}(u, v) = \begin{cases} w(u, v) & \text{si } u, v \in S \\ 0 & \text{si } u = x_0 \end{cases}$

 (res, d, Π) := PCC-Bellman-Ford(G^+, x_0)

 si res == $\perp$ alors

 Afficher("le graphe G contient un cycle strictement négatif.")

 sinon

 pour chaque $v \in S$ faire $h(v) := d(x_0, v)$

 pour chaque $(u, v) \in A$ faire $w_h(u, v) := w(u, v) + h(u) - h(v)$

$G_h :=$ Graphe(S, A, w_h)

 pour chaque $u \in S$ faire

 (d', Π) = PCC-Dijkstra(G_h, u)

 pour chaque $v \in S$ faire $d_{uv} := d'[v] + h(v) - h(u)$

 return D

end

Algorithme 1 : algorithme de Johnson

Annexe

On rappelle ci-dessous l'algorithme de parcours en profondeur : la procédure de base PP et la procédure principale PPC.

Procédure PP(G, s)

// $G = (S, A)$

begin

 Couleur[s] := gris;

 temps ++;

 d[s] := temps;

pour chaque $(s, u) \in A$ **faire**

si Couleur[u] = blanc **alors**

$\Pi[u]$:= s ;

 PP(G, u);

 Couleur[s] := noir;

 temps ++;

 f[s] := temps;

end

Procédure PPC(G)

// $G = (S, A)$

begin

pour chaque $x \in S$ **faire**

 Couleur[x] := blanc;

$\Pi[x]$:= nil;

 temps := 0;

pour chaque $x \in S$ **faire**

si Couleur[x] = blanc **alors**

 PP(G, x);

end

On rappelle ci-dessous l'algorithme de Dijkstra et l'algorithme de Bellman-Ford :

Procédure PCC-Dijkstra(G, s)

// $G = (S, A, w)$: un graphe orienté valué

// $s \in S$: un sommet origine.

begin

pour chaque $u \in S$ **faire**

$\Pi[u]$:= nil

 d[u] := $\begin{cases} 0 & \text{si } u = s \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}$

$F := \text{File}(S, d)$

tant que $F \neq \emptyset$ **faire**

$u := \text{Extraire-Min}(F)$

pour chaque $(u, v) \in A$ **faire**

si d[v] > d[u] + $w(u, v)$ **alors**

 d[v] := d[u] + $w(u, v)$

$\Pi[v]$:= u

 MaJ-F-Dijkstra(F, d, v)

 return (d, Π)

end

Procédure PCC-Bellman-Ford(G, s)

// $G = (S, A, w)$: un graphe orienté valué

// $s \in S$: un sommet origine

begin

pour chaque $u \in S$ **faire**

$\Pi[u]$:= nil

 d[u] := $\begin{cases} 0 & \text{si } u = s \\ \infty & \text{sinon} \end{cases}$

pour $i = 1$ à $|S| - 1$ **faire**

pour chaque $(u, v) \in A$ **faire**

si d[v] > d[u] + $w(u, v)$ **alors**

 d[v] := d[u] + $w(u, v)$

$\Pi[v]$:= u

pour chaque $(u, v) \in A$ **faire**

si d[v] > d[u] + $w(u, v)$ **alors**

 return ($\perp, -, -$)

 return ($\top, d, \Pi$)

end